Andorinha-do-mar-anã

Little tern

(*Sternula albifrons*)

Curiosidades / ***Fun facts***

Esta ave tem uma técnica de pesca impressionante: paira perto do seu alvo e mergulha a pique para capturar pequenos peixes na superfície da água. *O nome em latim "albi" (branco) +"frons" (testa) é uma dica de como podemos identificar esta espécie.*

This bird has an impressive fishing technique: it hovers close to the target and plunges to capture small fish in the surface of the water. The latin name "albi" (white) + "frons" (forehead) is a tip to how we can identify this species. Check the picture to see if it makes sense.

Descrição / ***Description***

Ave pequena, com cerca de 23 cm de comprimento. Tem o bico amarelo com a ponta preta, as patas amarelas e a fronte branca (também no Verão). As primárias mais externas são pretas. Os juvenis têm o dorso com um aspecto "escamoso", as secundárias mais claras do que o resto das asas e o bico preto.

Small bird, with about 23cm in length. Has a yellow bill with a black tip, yellow legs and a white forehead (also in Summer). The external primaries are black. The juveniles have a black back, with a "scaly" aspect, the secundaries are brigther than the rest of wings and they have a black tip.

~23 cm

Pode-se ver de Abril a Setembro
May be seen from April to September

Ecologia / *Ecology*

Espécie de distribuição principalmente costeira. A reprodução ocorre, entre finais de Abril e Julho, em praias e dunas com cobertura de vegetação reduzida, sapais, salinas, pisciculturas e em ilhas situadas em lagoas ou barragens. As posturas são constituídas por 1 a 3 ovos, durando o período de incubação entre 18 a 22 dias. Fora da época de reprodução, apresenta uma distribuição mais alargada, ocorrendo ao longo de toda a costa, sendo comum em zonas estuarinas e em lagoas costeiras, em particular durante a migração pós-nupcial. Alimenta-se de pequenos peixes e crustáceos, em lagoas costeiras e rias mas também no mar, sobretudo no Algarve.

Species with a mostly coastal distribution. Breeding occurs between late April and June, in beaches and dunes with little vegetation covering, marshes, fish farms and in islands in lagoons or dams. The clutches are typically 1 to 3 eggs, with incubation lasting 18 to 22 days. Outside breeding season, it presents a wider distribution, occuring in most of the coastline, being commonly found in stuaraine areas and coastal lagoons, particiulary during post-nupcial migration. It feeds on smalls fishes and crustaceans, in coastal lagoons and streams, but also in the sea, especially in the Algarve.

Fenologia / *Phenology*

Migrador Reprodutor

Breeding migratory bird

Estado de conservação / *Conservation status*

Vulnerável (VU)

Vulnerable (VU)

Textos adaptados da Plataforma Biodiversidade a seus pés (http://almargem.org/biodiv/)

Texts adapted from the "Biodiversidade a seus pés" plataform (http://almargem.org/biodiv/)

Tavira verde
Empresa Municipal de Ambiente, E.M.

Programa
Program
Bandeira Azul 2021

Colaboração
Collaboration
Almargem